

تمهیدات حمایتی لازم برای افشای خطای پزشکی از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صدیقه ابراهیمی^۱، زهرا همتی^{}

تاریخ انتشار: 98/11/12

تاریخ پذیرش: 98/10/14

تاریخ دریافت: 98/7/20

مقاله‌ی پژوهشی

چکیده

خطای پزشکی یکی از مباحث بسیار مهم اخلاقی و حقوقی است که گاه در انجامدادن مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان تیم مراقبت درمانی و سلامت رخ می‌دهد. با توجه به ضرورت افشای خطای پزشکی و نبود حمایت‌های فردی و سازمانی کافی در این زمینه، در این مطالعه به بررسی راهکارهای تسهیل افشای خطا و همچنین افزایش انواع تمهیدات حمایتی از دیدگاه دستیاران پرداخته شده است. این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی با جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی دستیاران رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۴۸ نفر به دست آمد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته (با روایی و پایابی مطلوب) جمع‌آوری و با نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شد. در این مطالعه افزایش امکانات حمایتی در جهت افشای خطای پزشکی (میانگین ۴.۳۸) مهم‌ترین و افزایش قانونمندی و شفافسازی فعالیت‌ها در محیط درمانی (میانگین ۴.۳۲) دومین عامل مؤثر بر ارتقای افشای خطای پزشکی ذکر شد. همچنین، بیمه‌ی مسئولیت پزشکی (میانگین ۴.۸۰) بیشترین اهمیت را در میان تمهیدات حمایتی داشت. ترس از عواقب حقوقی و قضایی مهم‌ترین عامل مؤثر بر کتمان خطا و داشتن وکیل مجرب و فرهنگ‌سازی در رسانه‌های عمومی به عنوان راه بروز رفت از آن اعلام شد. در مطالعه‌ی حاضر اگرچه اغلب دستیاران با افشای خطای پزشکی موافق بودند، ایجاد یک سیستم حمایتی را ضروری دانستند. با توجه به عملکرد تیمی در درمان بیماران، حمایت‌ها باید از تمامی اعضای گروه صورت گیرد.

واژگان کلیدی: تمهیدات حمایتی، خطا، خطای پزشکی

۱. دانشیار، گروه اخلاق پزشکی و فلسفه‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

۲. پژوهش عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

*نویسنده‌ی طرف مکاتبه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان کریم‌خان زند، دانشکده‌ی پزشکی، ساختمان شماره‌ی ۲، بخش اخلاق پزشکی و فلسفه‌ی سلامت، تلفن: ۰۷۱۳۲۲۴۸۹۸۰، Email: zh.m.sh.eth@gmail.com

مقدمه

لازم برای افشای خطای و نبود امکانات حمایتی لازم برای افشای خطای (۷و۸). براون^۲ و همکاران در مطالعه‌ی خود نشان داده‌اند کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی، بر نگرش کارآموزان رادیولوژی نسبت به افشای خطای تأثیری مفید و مثبت دارد (۹). در مقاله‌ی Manser^۳ و همکاران، سیستم‌های حمایتی مؤثر برای پزشکان و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات، آموزش در رابطه با چگونگی مدیریت بحران و حفظ حریم شغلی در روند گزارش‌دهی و افزایش آگاهی کارکنان حوزه سلامت در زمینه استانداردها و مهارت‌های لازم در رابطه با چگونگی گزارش‌دهی خطاهای از مهم‌ترین موارد بیان شده در راستای پذیرش افشای خطای پزشکی، بودند (۴). وگنر^۴ و همکاران در مطالعه‌ی خود علاوه بر بیان تسهیل‌کننده‌ها و موانع بیان خطاهای پرستاری معتقد‌ند حذف موضع سر راه افشای خطای با هدف شرکت فعال پرستاران در فرایندهای افشای خطای، به حرکت به سوی یک فرهنگ امنیت نیاز دارد (۱۰). در مطالعه‌ی موحدنیا و همکاران، ترس از پیامدهای گزارش‌دهی یکی از علل مهم گزارش‌نکردن اشتباهات بوده است (۱۱). نصیری‌پور و همکاران، گزارش‌دهی را به عنوان یکی از مؤلفه‌های مدیریت پیش‌گیری از خطای معروفی و عوامل مؤثر بر گزارش‌دهی را بررسی کردند (۱۲). نتایج پژوهش برآک^۵ و همکاران نیز اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و مدیریت بحران را تأیید می‌کنند. به طوری که می‌توان امیدوار بود آموزش‌های استاید، دستیاران را مقاعده کرده است که به گزارش تخلفات پزشکی مبادرت ورزند (۱۳).

آگاهی از انواع راهکارهای تسهیل‌کننده افشای خطای پزشکی و انواع امکانات حمایتی لازم برای افشای خطای

خطای پزشکی کارکنان گروه مراقبت درمانی و سلامت، صرف‌نظر از میزان تعهد و دقت آن‌ها در انجام مهارت‌های حرفه‌ای خود، جزئی جدایی‌ناپذیر از سیستم سلامت است. طبق تعریف کمیسیون مشترک مربوط به سازمان‌های مراقبت سلامت^۱، خطای پزشکی که به حاضر غفلت صورت می‌گیرد و با استانداردهای سیستم مراقبت سلامت مطابقت نمی‌کند، موضوعی جهانی، هزینه‌بر و عامل بخشی از مرگ‌ومیر و آسیب به بیماران است (۱۴).

بر اساس متون حقوقی، هرگونه اقدام‌کردن یا نکردن پزشک که موجب تحمل خسارت جسمی، مالی یا معنوی به بیمار شود خطای پزشکی خوانده می‌شود و باید به طور صادقانه و درست، اظهار و بیان شود. وقوع خطای ضرورتاً رفتار غیراخلاقی محسوب نمی‌شود؛ اما اظهار نکردن آن می‌تواند این‌گونه باشد. از جمله سودمندی‌های بالقوه اظهار خطای پزشکی می‌توان به افزایش اعتماد جامعه به پزشکان، جبران آسیب ایجاد شده در اثر خطای، حفاظت از حقوق بیمار و تقویت رابطه‌ی پزشک و بیمار، کاهش احتمال شکایت قانونی از پزشک، پیشگیری از خطاهای مشابه آینده اشاره کرد (۱۵-۱۶)؛ بنابراین به کارگیری رویکردی مناسب برای جلوگیری از عواقب ناشی از خطای پزشکی برای کادر درمان در جهت برخورد با آن در ارتباط بین دو گروه (بیماران و کادر درمان) ضروری است؛ اما معمولاً گروه درمانی در افشای کامل و صادقانه‌ی خطای پزشکی با موانع روبرو می‌شوند (۱۶).

بیشترین موضع کادر درمانی هنگام افشای خطای پزشکی عبارت‌اند از: ترس از شکایت قانونی و عواقب حقوقی قضائی، ترس از دستدادن اعتماد بیمار و اعتبار شغلی، ترس از واکنش‌های احساسی بیماران و همراهانشان، نبود مهارت‌های

2. Brown
3. Manser
4. Wagner
5. Brock

1. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)

مقالات قبلی و پرسشنامه‌های به کار رفته در آنها و همچنین به کمک یک مصاحبه‌ی اولیه با ده نفر از دستیاران رشته‌های مختلف تهیه شد. پس از طراحی اولیه‌ی پرسشنامه، به منظور بررسی روایی آن از نظر صوری و محتوا به نظرخواهی از پان خبرگان شامل دو نفر از استادان بخش اخلاق پزشکی و شش نفر از استادان سایر رشته‌ها (جراحی، داخلی، زنان، کودکان و دو نفر از بخش‌های مینور) پرداختیم؛ سپس پرسشنامه بعد از انجام اصلاحات لازم و رفع ایرادات وارد به آن، به منظور بررسی پایایی با استفاده از روش آزمون - بازآزمون، بین بیست نفر از دستیاران رشته‌های مختلف تخصصی توزیع و در فاصله‌ی زمانی دوهفته‌ای تکرار شد و ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۰/۷، محاسبه و پایایی آن تأیید گردید. این پرسشنامه شامل سه قسمت بود: بخش اول، اطلاعات جمعیت‌شناختی شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، رشته‌ی تخصص و سال دستیاری (یک تا چهار) بود؛ بخش‌های بعد شامل دو نوع سوالات بود: سوالات چندگزینه‌ای (شش سؤال) در زمینه‌ی اطلاعات کلی درباره‌ی افسای خطا و سوالات با مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت درباره‌ی راهکارهای تسهیل‌کننده اظهار خطای پزشکی (هفت سؤال) و میزان اهمیت مؤلفه‌های حمایتی برای افسای خطا پزشکی از نظر دستیاران (چهارده سؤال) که از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها را در یک طیف لیکرتی (یک: اصلاً مهم نیست تا پنج: کاملاً مهم است) مشخص کنند. در نهایت اطلاعات از طریق نرم‌افزار آماری SPSS 21 و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد و...) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) تحلیل شد.

یافته‌ها

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که از مجموع ۲۵۲ نفر شرکت‌کننده، ۲۴۶ نفر سن خود را در پرسشنامه ذکر کرده (میانگین سنی $4/27 \pm 30/29$) و شش نفر ذکر نکرده بودند.

می‌تواند موجب تعییه‌ی رویکردی سازمانی به خطای پزشکی و منجر به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان برای کمک به افشاری خطای پزشکی شود. با وجود شکل‌گیری مطالعات متعدد در زمینه‌ی افسای خطا پزشکی، تاکنون مطالعه‌ای در ایران در زمینه‌ی بررسی انواع تمهدات حمایتی لازم برای افشاری خطای پزشکی صورت نگرفته است. در مطالعه‌ی حاضر انواع راهکارهایی که می‌تواند موجب تسهیل افشاری خطای شوند، بررسی شده‌اند. همچنین افزایش امکانات حمایتی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها به تفصیل در کانون توجه قرار گرفته و انواع امکانات حمایتی برحسب میزان اهمیت از دیدگاه دستیاران درجه‌بندی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی تمهدات حمایتی لازم برای افشاری خطای پزشکی از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

روش کار

پژوهش حاضر که مطالعه‌ای توصیفی‌مقطوعی است، در سال ۱۳۹۵ انجام گرفته است. دستیاران تمام رشته‌های تخصصی پزشکی اعم از رشته‌های جراحی و غیرجراحی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی و همچنین درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۷۲۴ نفر) جامعه‌ی آماری این پژوهش بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان کریجی ۲۵۲ به دست آمد. در این مطالعه دستیاران تعداد ۱۲۴ نفر دستیار رشته‌های جراحی (جراحی عمومی، زنان و زایمان، نوروسرجری، یوروولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی و چشم) و ۱۲۸ نفر دستیار رشته‌های غیرجراحی (داخلی، اطفال، قلب، نوروولوژی، پوست، پاتولوژی، طب اورژانس، رادیولوژی، بیهوشی، روان‌پزشکی، توانبخشی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای و پزشک خانواده) بودند. اطلاعات مدنظر در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است. این پرسشنامه با استفاده از مطالعات و

جدول شماره‌ی ۲- فراوانی و درصد فراوانی مقصو خطا در اکثر موقع از نظر دستیاران			
درصد تجمعی	درصد فراوانی	فراوانی	سؤال
1. به نظر شما در اکثر موقع بروز خطا چه کسی مقصو است؟			
21.4	21.4	54	پزشک معالج بهنهایی
33.7	12.3	31	ساخ پزشکان همکار در گروه درمانی
40.1	6.3	16	گروه پرستاری در گروه درمانی
57.9	17.9	45	خود بیمار یا همراهان بیمار
2. به نظر شما در اکثر موقع چه کسی متوجه بروز خطا می‌شود؟			
53.2	53.2	134	پزشک معالج
84.1	31.0	78	ساخ پزشکان همکار در گروه درمانی
89.3	5.2	13	گروه پرستاری در گروه درمانی
93.3	4.0	10	خود بیمار یا همراهان بیمار
100.0	6.7	17	همه‌ی موارد
	.4	1	بدون پاسخ
	100.0	252	کل
3. میزان تمايل شرکت‌کننده به افشا یا عدم افشاگری خطای پزشکی			
29.8	29.8	75	عدم افشا
100.0	70.2	177	افشا
4. عوامل مؤثر بر عدم افشاگری خطای پزشکی			
10.4	10.3	26	بیمار قادر به فهم خطا نیست
71.3	60.7	153	ترس از عواقب حقوقی قضایی
75.3	4.0	10	ترس از دستدادن اعتبار شغلی
86.1	10.7	27	ترس از دستدادن اعتماد بیمار
100.0	13.9	35	ترس از واکنش شدید خانواده و همراهان
	0.4	1	بدون پاسخ

نتایج پژوهش نشان داد ۱۶/۹ درصد شرکت‌کنندگان گزارش خطای درمانی را که موجب صدمه‌ی کمی به بیمار شده ضروری نمی‌دانند و ۱۵/۸ درصد از آن‌ها، اظهار خطای منجر به صدمه‌ی عمده را در صورت ارتکاب غیرمحتمل دانستند. در بررسی اینکه در صورت اظهار خطای آن را به چه کسی اظهار می‌کنند معلوم شد ۲۸ درصد از دستیاران با

حداقل سن ۲۵ و حداقل آن ۵۲ بود. جزئیات اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی نمونه را در متغیرهای مختلف در جدول شماره‌ی یک مشاهده می‌شود.

جدول شماره‌ی ۱- توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناسنامی

متغیر	نوع رشته	وضعیت تأهل	جنس	مرد	زن	کل پاسخ	بی‌پاسخ	مجرد	متأهل	کل پاسخ	بی‌پاسخ
فراءانی	درصد فراءانی			43.7	110						
				55.6	140						
				99.2	250						
				0.8	2						
				36.1	91						
				61.1	154						
				97.2	245						
				2.8	7						
				49.2	124						
				50.8	128						
				100.0	252						
				33.7	85						
				28.2	71						
				25.4	64						
				10.7	27						
				98.0	247						
				2.0	5						
سال دستیاری											

پاسخ دستیاران به سؤال اول و دوم پژوهش نشان داد اکثر افراد مورد مطالعه (۴۲/۱%) به علت تیمی بودن کادر پزشکی، تمام افراد تیم درمان را مقصو بروز خطا عنوان کردند و بیشتر دستیاران (۵۳/۲%) اشاره داشتند که «پزشک معالج» در اکثر موقع متوجه بروز خطا می‌شود (نک: جدول شماره‌ی دو).

دستیاران در جدول شماره ۴ نشان داده شده است.

جدول شماره ۳- میانگین و انحراف معیار پاسخ دستیاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده افشاری خطای پزشکی (تعداد: ۲۵۰)

انحراف معیار	میانگین	عوامل تسهیل کننده افشاری خطای پزشکی
۰.۹۵	۴.۳۸	افزایش امکانات حمایتی در جهت افشاری خطای پزشکی
۱.۱۴	۳.۵۴	وجود بازرس خطای پزشکی برای ارزیابی و پایش فعالیت پزشکان
۱.۱۲	۳.۵۸	ارتقا سیستم گزارش دهنده خطاهای پزشکی
۱.۱۷	۳.۴۶	تشویق پزشکان به افشاری داوطلبانه خطای با توجه به فواید آن
۱.۱۵	۳.۵۸	استفاده از روش‌های خوداظهاری محترمانه خطای
.۸۱	۴.۳۱	افزایش قانونمندی و شفافسازی فعالیت‌ها در محیط درمانی
۱.۳۸	۳.۱۵	تلاش برای مشارکت دادن بیمار در تصمیم‌گیری‌های درمانی

اطلاع‌دادن خطای بیمار یا همراهان، ۵۱/۳ درصد با اطلاع‌دادن خطای به همکاران و سایر اعضای تیم درمانی و ۲۰/۷ درصد آنها با اطلاع خطای بیمارستان موافق بودند. از نظر دستیاران، افزایش امکانات حمایتی در جهت افشاری خطای پزشکی با میانگین ۴.۳۸، مهم‌ترین عامل مؤثر بر افشاری و گزارش خطای پزشکی است. دستیاران در مرتبه‌ی بعدی بر عامل افزایش قانونمندی و شفافسازی فعالیت‌ها در محیط درمانی (میانگین ۴.۳۲) تأکید کرده‌اند (نک: جدول شماره‌ی سه).

تمهیدات حمایتی لازم برای افشاری خطای پزشکی

در بررسی درجه‌ی اهمیت انواع حمایت‌های سازمانی لازم برای افشاری خطای پزشکی میان دستیاران رشته‌های جراحی و دستیاران رشته‌های غیرجراحی، «بیمه‌ی مسئولیت پزشکی» با میانگین ۴.۸۰ در هر دو گروه جراحی و غیرجراحی، بیشترین اهمیت را در میان تمهیدات حمایتی از نظر دستیاران دارد. پس از آن «داشتن وکیل مجرب در زمینه‌ی مسئولیت پزشکی» و «فرهنگ‌سازی رسانه‌های عمومی درباره‌ی اجتناب ناپذیر بودن خطای»، به ترتیب با میانگین‌های ۴.۶۸ و ۴.۶۷ برای رشته‌های جراحی و غیرجراحی، در درجات اهمیت دوم و سوم قرار گرفته‌اند. تمهیدات حمایتی بر اساس درجه‌ی اهمیت از دیدگاه

جدول شماره ۴- نظرات دستیاران درباره‌ی اهمیت انواع حمایت‌های سازمانی برای افشاری خطای پزشکی

تمهیدات حمایتی	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	دستیاران رشته‌های جراحی (تعداد: ۱۲۸)
بیمه‌ی مسئولیت پزشکی	۴.۸۰	۰.۵۰	۴.۸۰	۰.۴۸	
داشتن وکیل مجرب در زمینه‌ی مسئولیت پزشکی	۴.۶۸	۰.۶۷	۴.۵۵	۰.۷۹	
همکاری مددکاری بیمارستان از نظر تعامل با بیمار و خانواده‌اش	۴.۲۳	۰.۹۷	۴.۲۱	۰.۹۳	
آموزش و دوره‌های بازآموزی در زمینه‌ی آشنایی با جنبه‌های قانونی و حقوقی پزشکی	۴.۴۱	۰.۸۸	۴.۳۰	۰.۹۹	

دستیاران رشته‌های غیرجراحی (تعداد: 128)		دستیاران رشته‌های جراحی (تعداد: 124)		تمهیدات حمایتی
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
0.95	4.53	0.81	4.67	فرهنگسازی رسانه‌های عمومی درباره‌ی اجتناب ناپذیر بودن خطا
0.76	4.46	0.75	4.48	اعتمادادسازی عمومی توسط سیستم پزشکی
0.81	4.26	0.81	4.39	انتخاب هیئت قضاویت از افراد متخصص در زمینه‌ی پزشکی
1.09	3.67	1.15	3.58	ایجاد راهکارهای تشویقی برای افشاءی داوطلبانه‌ی خطا
1.06	3.67	1.14	3.56	آموزش‌های اخلاقی برای پزشکان در جهت مسئولیت‌پذیری و نوع دوستی
1.03	4.13	1.02	4.07	حمایت روانی اجتماعی از پزشک در جهت جبران خطا
0.81	4.42	0.79	4.41	حمایت اقتصادی از پزشک در جهت جبران خطا
0.84	4.32	0.94	4.16	واضح و قابل فهم کردن فرم‌های رضایت و برائت
1.21	3.84	1.08	3.90	آموزش مهارت‌های ارتباطی به پزشکان
1.23	3.79	1.09	3.87	آموزش مهارت ارائه‌ی خبر بد به پزشکان

و تفاوت معنی داری در نتایج دیده نشد ($p=0.79$) (نک: جدول شماره ۴ پنج).

میانگین امتیاز نظرات دستیاران گروه جراحی و غیرجراحی در خصوص اهمیت تمهیدات حمایتی لازم برای افسشای خطای پزشکی با استفاده از آزمون t مستقل مقایسه شد

جدول شماره‌ی ۵- نظرات دستیاران دو گروه جراحی و غیر جراحی درباره‌ی اهمیت تمهیدات حمایتی

متغیر	تعداد نمونه	میانگین	انحراف استاندارد	درجهی آزادی	مقدار t	سطح معنی داری
جراحی	۱۲۴	۴.۲۳	۰.۵۶۹	۲۹۸	۰.۲۶۷	۰.۷۹۰
غیر جراحی	۱۲۸	۴.۲۲	۰.۵۵۵			

ترس ازدستدادن اعتبار شغلی و حمایت بیمار، از اظهار خطای پزشکی و اهمیت مدیریت بحران و چگونگی مواجهه با خطای پزشکی و اثرباره درباره غیراخلاقی نبودن این امر درمان پرهیز می‌کند. همچنین نتایج مطالعات پیشین این امر می‌دهد لزوم فرهنگ‌سازی درباره غیراخلاقی نبودن خطای پزشکی و اهمیت مدیریت بحران و چگونگی مواجهه با خطای پزشکی هستند (۱۴ و ۱۵).

بحث

مطالعه‌ی حاضر به دنبال بررسی میزان اهمیت مؤلفه‌های حمایتی برای افشاری خطای پزشکی از دیدگاه دستیاران صورت گرفته است تا در ادامه تدابیری در جهت سیاست‌گذاری در زمینه‌ی فراهم کردن امکانات حمایتی لازم برای افشاری خطای پزشکی در کشور اندیشیده و اتخاذ شود. مطالعات متعدد نشان می‌دهد اکثربت بـشکان به علت

به وجود آمده حل نشده و فرد تدبیری برای مواجهه‌ی درست با موقعیت مشابه را در آینده ندارد.

از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد بیشتر نمونه‌های بررسی شده (۷۰%) به گزارش خطا معتقدند. باید به این نکته توجه کرد که شخص با پذیرفتن خطای خود، نیمی از راه را در جهت کاهش خطا پیموده است. بر اساس نتایج نظرسنجی دستیاران، با توجه به عملکرد تیمی در طول دوره‌ی درمان، اغلب فرد خاصی به تهایی مسئول بروز اشتباه نیست و این نشان می‌دهد حمایت‌ها در جهت افشای خطا باید از تمامی اعضای گروه صورت گیرد. طبق نتایج نظرسنجی، اغلب خود پزشک معالج یا در مرتبه‌ی بعدی پزشک دیگر حاضر در گروه، اشتباه را شناسایی می‌کنند؛ لذا نبود حمایت‌های لازم از پزشک معالج ممکن است منجر به این شود که خطا هرگز افشا نشود.

مطالعات و گنر، به لزوم تدوین سیستم گزارش‌دهی قوی برای مشخص کردن دقیق چگونگی رخدادن اشتباه اشاره کرده است. در واقع شفافیت در جامعه زمانی تحقیق‌پذیر است که نظام ثبت اطلاعات با سیستم کارآمد با امنیت بالا در همه‌ی عرصه‌های آن نهادینه شده باشد؛ مسلم است شفاف کردن عامل اشتباه با این سیستم چندان سخت نخواهد بود (۱۰). نصیری‌پور در رابطه با معیارهای تدوین یک سیستم گزارش‌دهی، مستقر کردن واحد گزارش‌دهی در مرکز، به همراه مشخص نمودن مسئول ذی‌ربط را یکی از عوامل تسهیل‌کننده‌ی گزارش خطا عنوان می‌کند. طبق نتایج مطالعه‌ی صورت گرفته در بررسی عوامل تسهیل‌کننده‌ی افشا و گزارش خطاهای پزشکی، افزایش امکانات حمایتی مهم‌ترین عامل شناخته می‌شود (۱۲).

آموزش پاسخ‌گویی پزشک و کاهش خطا، ارتقای فرهنگ خود گزارش‌دهی خطاهای و آموزش مهارت‌های لازم درباره‌ی چگونگی انجام آن نیز مؤلفه‌های دیگری است که باید در کانون توجه قرار گیرند. وجود بیمه‌ی مسئولیت پزشکی و

کارشناسان باسابقه در حوزه‌ی اینمی بیمار انجام شد، بسیاری از شرکت‌کنندگان، مشکلات مربوط به بازگویی و گزارش‌دهی خطاهای پزشکی و عواقب قانونی مرتبط با آن را چالشی شایان توجه در این حوزه دانستند. این گروه معتقد بودند در نظام کنونی ارائه‌ی خدمات سلامت، در بسیاری از مواقع افراد به علت عوارض و تبعات قانونی گزارش خطا، از اذعان آن خودداری می‌کنند (۱۶).

در این مطالعه نیز مشابه با مطالعه‌ی موحدنیا (۱۱) مشخص شد ترس از عواقب حقوقی و قضایی مهم‌ترین عامل مؤثر بر عدم افشای خطای پزشکی است؛ اما نکته‌ی حائز اهمیت در مطالعه‌ی حاضر، شکاف بزرگی است که بین این مؤلفه در مقایسه با دیگر موارد در نظرسنجی به چشم می‌خورد. در واقع مؤلفه‌های دیگری همچون: ترس از دستدادن شغل و حمایت بیماران با اختلاف زیادی در مراتب بعدی قرار دارد.

به نظر می‌رسد عواقب حقوقی و قضایی که با هدف نظم‌بخشیدن به نهادهای پزشکی تدوین شده‌اند، بزرگ‌ترین مانع در برابر شفاف بودن فضای پزشکی و ارتقای آن است؛ تا آن‌جاکه دستیاران متول‌شدن به بیمه‌ی مسئولیت پزشکی و پس از آن، داشتن وکیل مجرب را گامی در جهت بروز رفت از چارچوب قضایی می‌دانند. این امر چالش بزرگی در حوزه‌ی شفاف‌سازی امر درمان به شمار می‌آید. ممکن است هر یک از اعضای گروه پزشکی به علت هراس از چگونگی مواجهه‌ی قانونی با خطای آنان و پشتیبانی نکردن بخش‌ها و عناصر دیگر جامعه از شفاف‌سازی، از اظهار خطا دوری جویند؛ لذا شاهد آن هستیم که با وجود تصویب قواعد و دستورالعمل‌ها، اظهار خطای پزشکی در تجربیات پزشکی به وضعیتی پایدار تبدیل نشده است و گاهی پیامدهای جبران‌نایابری مانند ازبین‌رفتن اعتماد بیمار نسبت به جامعه‌ی پزشکی، از دستدادن فرصت درمان و کاهش کیفیت روند درمانی را به مرور زمان به دنبال خواهد داشت؛ زیرا چالش

پیشنهادها

- بررسی میزان مسئولیت‌پذیری کادر پزشکی در قالب اشتباهات انجام‌گرفته؛
- بررسی اشتباهات گروه پرستاری در برابر اشتباهات شخص پزشک معالج در بین اشتباهات رخداده؛
- بررسی علل دقیق حادثه به غیر از اشتباه شخص مثل امکانات پزشکی و غیره؛
- توجیه بیمار و بستگان درباره اشتباهات غیرعمد و تفکیک این اشتباهات برای برطرف کردن برچسب بی‌کفایتی و بی‌سوادی گروه پزشکی؛
- تدوین سیستم گزارش‌دهی مناسب و ارزیابی آن به طور دوره‌ای؛
- تغییر رویکرد سازمانی از مجازات‌محور به کارآمدکردن نیروی کار؛
- بررسی میزان اشتباهات بخش‌های مختلف و ارزیابی آن بر اساس چگونگی سیستم گزارش‌دهی و نظام پاداش و تنبیه در هر یک؛
- بررسی و مقایسه میزان اشتباهات پزشکی در بین بیمارستان‌های خاص با هدف آموزش مهارت‌های لازم.

فرهنگ‌سازی رسانه‌های عمومی درباره اجتناب‌ناپذیر بودن خطای دیگر مواردی هستند که در افسا و گزارش‌دهی خطای مؤثرند. علاوه بر آموزش‌های نرم‌افزاری در رابطه با چگونگی مدیریت بحران و حفظ حریم شغلی در روند گزارش‌دهی، موارد سخت‌افزاری را نیز باید بررسی کرد (۴).

نتیجه‌گیری

نگاه اجمالی به یافته‌ها نشان می‌دهد، دستیاران علی‌رغم تأیید مزایای گزارش خطای صورت‌گرفته معتقدند کار درمانی به صورت تیمی است و عضو خاصی به تنها می‌باشد اشتباه رخداده نیست. هرچند پزشک گروه معمولاً اولین فرد تشخیص‌دهنده اشتباه است، چنان‌که پیش‌تر بحث شد ممکن است با توجه به وجود موانعی بر سر افسای بروز خطای مشکل هرگز منعکس نشود.

بر اساس یافته‌ها، دستیاران بر این باور هستند که نخست افزایش امکانات حمایتی و بعد از آن، افزایش قانونمندی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در محیط درمانی، ایجاد تعادل میان افشا و آشکارسازی تخلفات از یکسو و متناسب و عادلانه‌بودن مجازات با تخلف از سوی دیگر، گامی مهم در ارتقای گزارش خطاهای پزشکی و پیشگیری از اشتباهات خواهد بود. تقویت روحیه‌ی کار جمعی و هماهنگی بین فعالیت‌تیم پزشکی و تعهد به اخلاق حرفه‌ای احتمال بروز خطاهای عمدى و سهل‌انگارانه را کاهش و احتمال گزارش شفاف خطاهای را افزایش می‌دهد. مسئولان ذی‌ربط نیز باید این امر را ارج نهاده و دغدغه‌های کادر پزشکی خود و بار روانی متتحمل شده‌ی آنان را در حد توان کاهش دهنند. افزون‌براین، تقویت نگرش سیستمی به خطاهای و نه نگرش فردی، استقرار نظام ارجاع و در نهایت نظام ثبت الکترونیک اطلاعات بیمار در آشکارشدن خطاهای پزشکی نقش مهمی خواهد داشت. توسعه‌ی بیمه‌ی مسئولیت حرفه‌ای پزشکان نیز می‌تواند نگرانی حاصل از آشکارشدن خطای را کاهش دهد.

منابع

- 1- Mohammadnejad E, Hojjati H, Sharifnia SH, Ehsani SR. Amount and type of medication errors in nursing students in four Tehran. *J Med Ethic Hist.* 2009; 3(1):60-9.
- 2- Northcott HC, Vanderheyden LC, Northcott JL, Adair CE, McBrien-Morrison C, Norton P, Cowell JW. Perceptions of preventable medical errors in Alberta, Canada. *International Journal for Quality in Health Care.* 2008; 20(2): 115-22.
- 3- Asghari F, Yavari N. Medical error disclosure. *IJDLD.* 2005; 5(5):25-35. [in Persian]
- 4- Manser T, Staender S. Aftermath of an adverse event: Supporting health care professionals to meet patient expectations through open disclosure. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica.* 2005; 49(6): 728-34.
- 5- Kuhpayehzadeh J, Soltani Arabshahi SK, Bigdeli S, Maryami F. Determine attitudes of TUMS residents towards medical errors self-disclosure and prevalent Factors affecting it (1391). *RJMS.* 2013; 20(108) :53-60
- 6- Schwappach D. In the aftermath of medical error: Caring for patients, family, and the healthcare workers involved. *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz.* 2015; 58(1): 80-6.
- 7- Wu AW, Boyle DJ, Wallace G, Mazor KM. Disclosure of adverse events in the United States and Canada: An update, and a proposed framework for improvement. *J Public Health Res.* 2013; 2(3): e32.
- 8- Ghalandarpoorattar SM, Kaviani A, Asghari F. Medical error disclosure: The gap between attitude and practice. *Postgrad Med J.* 2012; 88(1037):130-3.
- 9- Brown SD, Callahan MJ, Browning DM, Lebowitz RL, Bell SK, Jang J, et al. *Radiology* trainees' comfort with difficult conversations and attitudes about error disclosure: Effect of a communication skills workshop. *J Am Coll Radiol.* 2014; 11(8): 781-7.
- 10- Wagner LM, Damianakis T, Pho L, Tourangeau A. Barriers and facilitators to communicating nursing errors in long-term care settings. *J Patient Saf.* 2013; 9(1): 1-7
- 11- Movahednia S, Partovishayan Z, Bastanitehrani M, Moradi F. Nurse Managers' perspectives about Reasons for not reporting medical errors in Firoozgar Hospital: 2012. *RJMS.* 2014; 21(125): 110-8.
- 12- Nasiripour AA, Raeissi P, Jafari M. The Role of disclosure and reporting in medical errors prevention. *Journal of Safety Promotion and Injury Prevention.* 2014; 2(2): 73-84.
- 13- Brock DM, Quella A, Lipira L, Lu DW, Gallagher TH. Physician assistants and the disclosure of medical error. *Academic Medicine.* 2014; 89(6): 858-62.
- 14- Elder NC, Graham D, Brandt E, Hickner J. Barriers and motivators for making error reports from family medicine offices: A report from the American academy of Family Physicians National Research Network (AAFPN RN). *J Am Board Fam Med.* 2007; 20(2): 115-23.
- 15- Parsapoor A, Mohammad K, Malekafzali H, Alaeddini F, Larjani B. The necessity of observing patients' right: Surveying patients', physicians' and nurses' attitudes around it. *Medical Ethics and History of Medicine.* 2009; 2 (4): 79-90.
- 16- Doshmangir L, Torabi F, Ravaghi H, Akbari Sari A, Mostafavi H. Challenges and solutions facing medical errors and adverse events in Iran: A qualitative study. *JHOSP.* 2016; 15(1): 31-40

Supportive Measures for Medical Error Disclosure from the Viewpoints of Residents in Shiraz University of Medical Sciences

Sedigheh Ebrahimi¹, Zahra Hemmati^{*2}

¹ Associate professor, Department of Medical ethics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran,

² Department of Medical Ethics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Abstract

Medical error is one of the most important ethical and legal issues that sometimes occur when a variety of health care practices are provided by healthcare professionals. Due to the necessity of medical error disclosure and lack of adequate personal and organizational support in this field, this study investigates strategies for facilitating error disclosure as well as increasing the variety of supportive measures from the perspective of residents. This was a descriptive cross-sectional study with statistical population including all residents of Shiraz University of Medical Sciences. The sample size was obtained using Morgan table as 248 participants. Data were collected using a researcher-made questionnaire (with descriptive and valid reliability) and analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics. In this study, increasing support facilities for medical error disclosure (mean 4.38) was the most important factor, and increasing the lawfulness and transparency of activities in the medical setting (mean 4.32) was the second factor affecting the promotion of medical error disclosure. Also, medical liability insurance (mean 4.80) was the most important supportive measure. The fear of legal and judicial consequences was reported as the most effective factors on the error concealment and having experienced lawyers and cultivation effects of mass media declared as the way out. In the present study, although most residents agreed with medical error disclosure, but due to the wide range of risk management problems that affect error disclosure, they found it necessary to establish a support system. Given the teamwork in health-care delivery, support should be given to all members of the treatment team.

Keywords: Supportive measures, Error, Medical error

* Corresponding Author: zh.m.sh.eth@gmail.com